



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНУ ПРОТИ COVID-19

Міокардит і перикардит



Міокардит - це запалення серцевого м'яза.
Перикардит - це запалення зовнішньої оболонки серця. Міокардит і перикардит можуть бути спричинені інфекцією, зокрема COVID-19, або іншим тригером.

Повідомлялося про рідкісні випадки міокардиту та/або перикардиту після вакцинації вакцинами Moderna та Pfizer проти COVID-19. Зареєстровані випадки, як правило, виникали протягом одного тижня після вакцинації та мали місце частіше:

- Після вакцинації первинною дозою серії Moderna для дорослих у порівнянні з оригінальною дозою Pfizer
- Після другої дози
- У віці від 12 до 29 років
- У чоловіків

Зареєстровані випадки були відносно легкими та швидко вирішувалися у більшості людей. Користь від вакцинації переважає дуже невеликий ризик міокардиту та/або перикардиту.

Повідомлялося про випадки міокардиту після щеплення вакциною Novavax проти COVID-19, але наразі незрозуміло, чи були вони спричинені вакциною. Моніторинг безпеки триває.



Рекомендації

Якщо після щеплення від COVID-19 у вас **з'явилися симптоми** міокардиту та/або перикардиту, негайно зверніться до лікаря. Симптоми можуть включати:

- Біль або тиск у грудях
- Задишку
- Швидке або незвичне серцебиття

Поговоріть зі своїм медичним працівником для отримання додаткової інформації, якщо протягом 6 тижнів після отримання вакцини Pfizer або Moderna проти COVID-19 у вас виникли:

- **Міокардит**, рекомендовано почекати з отриманням наступних доз вакцини Moderna або Pfizer проти COVID-19.
- **Перикардит**, можливо, ви зможете отримати додаткові дози вакцини Moderna або Pfizer проти COVID-19, коли одужаєте та після вакцинації мине принаймні 90 днів.

Якщо у вас в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з отриманням вакцини проти COVID-19, радимо поговорити з лікарем для отримання додаткової інформації, перш ніж отримати вакцину проти COVID-19 Pfizer або Moderna. Якщо вам більше не потрібно медичне спостереження, ви можете отримати вакцину.



www.nshealth.ca/coronavirusvaccine