

Différences entre anaphylaxie et syncope ou évanouissement

OUTIL D'AIDE



Anaphylaxie

Comment la détecter : (réaction allergique grave)

Manifestation rapide
(en 15 minutes, jusqu'à 2 à 4 h)
Toux, essoufflement
Douleurs au ventre, nausées et vomissements
Éruption cutanée, démangeaisons
Sentiment de mort imminente
Augmentation de la fréquence cardiaque

Ce qu'il faut faire :

AGIR VITE
FAIRE UNE INJECTION D'ÉPINÉPHRINE
APPELER LES SECOURS
APPELER LE 911

2 SYSTÈMES DE L'ORGANISME ATTEINTS OU PLUS



Syncope ou évanouissement

Comment les détecter : (syncope ou évanouissement provoqué par le stress)

Pendant ou immédiatement après la piqûre
Étourdissement, nervosité
Mouvements semblables à des convulsions
Peau pâle, froide et moite
Perte de connaissance
Diminution de la fréquence cardiaque

Ce qu'il faut faire :

Se pencher en avant / S'allonger
Se mettre en position latérale de sécurité /
Surélever les jambes / Desserrer les vêtements
Mettre la tête entre les jambes
Mettre une compresse froide sur le cou

AMÉLIORATION APRÈS S'ÊTRE ALLONGÉ