



COVID-19 INFORMATION SUR LES VACCINS

Myocardite et péricardite



La **myocardite** est une inflammation du muscle cardiaque. La **péricardite** est une inflammation de la paroi entourant le cœur. La myocardite et la péricardite peuvent être causées par une infection, comme la COVID-19, ou un autre élément déclencheur.

De rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés chez des personnes ayant reçu le vaccin Moderna ou Pfizer contre la COVID-19. Ces cas sont généralement survenus dans la semaine suivant la vaccination et se sont produits plus souvent :

- après la première série du vaccin Moderna pour adultes, par rapport au vaccin Pfizer;
- après la deuxième dose;
- chez les personnes âgées de 12 à 29 ans;
- chez les hommes.

Il s'agissait de cas relativement bénins, et la plupart des personnes se sont rapidement rétablies. Les avantages que procurent les vaccins sont supérieurs au risque très faible de myocardite ou de péricardite.

Des cas de myocardite ont été signalés chez des personnes ayant reçu le vaccin Novavax contre la COVID-19, mais le lien n'est pas encore établi. La surveillance de l'innocuité des vaccins se poursuit.



www.nshealth.ca/coronavirusvaccine

(En anglais seulement)

Mis à jour le 25 octobre 2023



Recommandations

Si vous présentez des symptômes associés à la myocardite ou à la péricardite après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19, consultez immédiatement un médecin. Les symptômes peuvent comprendre ce qui suit :

- Douleur ou pression à la poitrine
- Essoufflement
- Rythme cardiaque rapide ou inhabituel

Parlez à votre fournisseur de soins de santé pour plus d'informations si, dans les 6 semaines suivant la réception d'un vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19, vous éprouvez :

- **myocardite**, il est recommandé d'attendre avant de recevoir d'autres doses du vaccin Moderna ou Pfizer;
- **péricardite**, vous pouvez peut-être recevoir d'autres doses du vaccin Moderna ou Pfizer lorsque vous êtes rétabli et qu'au moins 90 jours se sont écoulés depuis votre vaccination.

Si vous avez déjà eu une myocardite, qui n'était cependant pas liée à un vaccin contre la COVID-19, nous vous recommandons d'obtenir des renseignements auprès de votre fournisseur de soins de santé avant de recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna. Si votre suivi médical est terminé, vous pouvez alors être vacciné.