

C'est quoi nirmatrelvir et le ritonavir?

- Une combinaison de deux médicaments, le nirmatrelvir et le ritonavir, pris ensemble pour traiter les personnes présentant des symptômes légers à modérés du COVID-19.
- Le nirmatrelvir est un antiviral qui empêche le virus responsable du COVID-19 de se multiplier. Le ritonavir aide le nirmatrelvir à agir dans l'organisme.
- Santé Canada a approuvé le nirmatrelvir et le ritonavir, pour le COVID-19 avec un "Avis de conformité avec les conditions". Cela signifie que les renseignements sur l'innocuité et l'efficacité continueront d'être surveillés au fur et à mesure que le médicament sera utilisé.




Comment le nirmatrelvir et le ritonavir peuvent-ils être utiles pour le COVID-19?

- Chez les personnes présentant des symptômes légers ou modérés de COVID-19, la prise de nirmatrelvir et de ritonavir peut réduire le risque que l'infection s'aggrave et devienne sévère et nécessite une hospitalisation ou évolue vers la mort.

Qui peut bénéficier du nirmatrelvir et du ritonavir ?

- Les adultes qui présentent un risque élevé d'être très malades (par exemple, les personnes âgées, celles qui ne sont pas vaccinées ou qui présentent certaines conditions médicales sous-jacentes ou une immunosuppression) peuvent bénéficier d'un traitement. Le nirmatrelvir et le ritonavir ne sont utiles qu'aux premiers stades de l'infection (dans les cinq jours suivant le début de la maladie et dans les cinq jours suivant un test COVID-19 positif).
- Le nirmatrelvir et le ritonavir pourraient ne pas être indiqués pour les personnes atteintes d'une maladie du foie ou des reins, d'autres maladies graves, ou si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. De nombreux médicaments d'ordonnance, produits en vente libre, médicaments traditionnels, produits de santé naturels et vitamines interagissent avec Le nirmatrelvir et le ritonavir et ne peuvent être pris ensemble (voir page suivante)

Comment dois-je prendre le nirmatrelvir et le ritonavir?



- Prenez 2 comprimés de nirmatrelvir (rose) et 1 comprimé de ritonavir (blanc) par voie orale deux fois par jour; le matin et le soir.
 - Chez les personnes atteintes d'une maladie rénale, la dose peut être différente.
- Si possible, les comprimés devraient être avalés entièrement. Si cela n'est pas possible, incluant pour l'administration via un tube entéral, veuillez contacter votre pharmacie pour de l'information additionnelle. Si vous oubliez une dose et qu'elle est prise dans les 8 heures suivant l'heure habituelle, prenez la dose dès que vous vous en souvenez. Si cela fait plus de 8 heures, sautez la dose et prenez la prochaine dose à l'heure habituelle.

Quelles sont les effets secondaires possibles ?

- Une altération du goût (environ 6 personnes sur 100 peuvent en souffrir).
- Diarrhée (environ 3 personnes sur 100 peuvent en souffrir).
- Hypertension artérielle (environ 1 personne sur 100 peut en souffrir).
- Douleurs musculaires (environ 1 personne sur 100 peut en souffrir).
- Des problèmes de foie sont également possibles. Informez immédiatement votre prestataire de soins de santé si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants de problèmes hépatiques : **perte d'appétit, jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse), urine de couleur foncée, selles de couleur pâle et peau qui démange, douleurs dans la région de l'estomac (abdomen).**
- Puisque le nirmatrelvir et le ritonavir sont des produits relativement nouveaux, tous les effets secondaires possibles ne sont pas connus. Certains peuvent être graves. Si vous avez des inquiétudes, consultez votre prestataire de soins de santé.

Que dois-je faire si mes symptômes de COVID-19 deviennent plus graves?

- En cas de changement légers de vos symptômes, appelez le 811 ou votre prestataire de soins primaires pour discuter de vos questions ou de vos inquiétudes
- Appelez immédiatement le 911 si vous présentez des symptômes graves tels que: **difficulté à respirer, douleur thoracique intense, perte de conscience, ou un état de confusion.**

Interactions médicamenteuses

Informez votre prescripteur de nirmatrelvir et ritonavir et le pharmacien qui vous délivre le nirmatrelvir et ritonavir de tous les médicaments d'ordonnance, produits en vente libre, médicaments traditionnels, produits de santé naturels et vitamines que vous utilisez.

Le nirmatrelvir et le ritonavir interagissent avec de nombreux médicaments d'ordonnance, produits en vente libre, médicaments traditionnels, produits de santé naturels et vitamines, ce qui peut entraîner des effets secondaires graves. Cela comprend les produits pris par la bouche, par injection, les gouttes pour les yeux, les inhalateurs, les crèmes et les vaporisateurs nasaux. Ne commencez pas à prendre de nouveaux médicaments d'ordonnance, des produits en vente libre, des médicaments traditionnels, des produits de santé naturels et des vitamines pendant que vous prenez du nirmatrelvir et du ritonavir sans consulter votre pharmacien pour vous assurer que vous pouvez le faire sans danger.

De nombreux médicaments interagissent avec le nirmatrelvir et le ritonavir et peuvent donc nécessiter une prise en charge particulière pendant votre traitement. Il peut être nécessaire de surveiller les tests de laboratoire ou les analyses de sang, ou de modifier la dose des autres médicaments.