

Vaccins contre la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

6 mois à 4 ans et 5 ans à 11 ans

Âges: 6 mois à 4 ans

Série primaire seulement
Pfizer ou Moderna pour jeunes enfants

Intervalles recommandés

**Moderna pour jeunes enfants –
série primaire de 2 doses**

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **8 semaines** (56 jours)

**Pfizer pour jeunes enfants –
série primaire de 3 doses**

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **8 semaines** (56 jours)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **8 semaines** (56 jours)

Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui sont **modérément ou gravement immunodéprimés** auront besoin d'une dose supplémentaire pour compléter leur série primaire.

Moderna pour jeunes enfants est recommandé.

Moderna pour jeunes enfants - série primaire de 3 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **4 semaines** (28 jours)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **8 semaines** (56 jours)

Pfizer pour jeunes enfants - série primaire de 4 doses

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **4 semaines** (28 jours)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **4 semaines** (28 jours)
- ✓ Entre les doses 3 et 4 – **8 semaines** (56 jours)

- » Comme le nombre de doses de la série primaire diffère entre Pfizer pour jeunes enfants et Moderna pour jeunes enfants, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans devraient **compléter leur série primaire avec le même type de vaccin.**
- » Les **doses de rappel** ne sont actuellement pas recommandées pour les enfants de cette tranche d'âge.
- » **Après leur guérison de la COVID-19**, les enfants de cette tranche d'âge devraient attendre **8 semaines** (56 jours) pour recevoir une dose de la série primaire.
- » Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être **administrés avec d'autres vaccins.**



Âges: 5 à 11 ans

Série primaire - Pfizer (original)
Dose de rappel - Pfizer bivalent

Intervalles recommandés

Entre les doses de la série primaire

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **8 semaines** (56 jours)

Entre la série primaire et la dose de rappel

- ✓ **6 mois** (168 jours)



» Après leur rétablissement de la COVID-19, les enfants âgés de 5 à 11 ans doivent attendre **8 semaines** avant de recevoir une dose de la série primaire. S'ils ont terminé leur série primaire, ils doivent attendre **6 mois** pour recevoir leur dose de rappel.

» Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être **administrés avec d'autres vaccins.**

Les enfants de 5 à 11 ans qui sont **modérément ou gravement immunodéprimés** auront besoin d'une troisième dose du vaccin pour compléter leur série primaire. **Ces enfants peuvent recevoir le vaccin Moderna (original) comme solution de rechange au vaccin Pfizer.**



Intervalles entre les doses de la série primaire

- ✓ Entre les doses 1 et 2 – **4 semaines** (28 jours)
- ✓ Entre les doses 2 et 3 – **8 semaines** (56 jours)

Entre les doses de la série primaire et la dose de rappel

- ✓ **6 mois** (168 jours)