

# Вакцини проти COVID-19 у Новій Шотландії

## 6 місяців - 4 роки і 5 - 11 років



### Вік 6 місяців - 4 роки

Лише початкова серія  
Вакцини Pfizer Infant або Moderna Infant

#### Рекомендовані інтервали:

**Moderna Infant – первинна серія з 2 доз**

- ✓ Дози 1-2 - **8 тижнів** (56 днів)

**Pfizer Infant – первинна серія з 3 доз**

- ✓ Дози 1-2 - **8 тижнів** (56 днів)
- ✓ Дози 2-3 - **8 тижнів** (56 днів)



Дітям віком від 6 місяців до 4 років **із помірним або важким імунodefіцитом** потрібна додаткова доза для завершення первинної серії.

**Рекомендується Moderna Infant.**

**Moderna Infant - первинна серія з 3 доз**

- ✓ Дози 1-2 - **4 тижні** (28 днів)
- ✓ Дози 2-3 - **8 тижнів** (56 днів)

**Pfizer Infant - первинна серія з 4 доз**

- ✓ Дози 1-2 - **4 тижні** (28 днів)
- ✓ Дози 2-3 - **4 тижні** (28 днів)
- ✓ Дози 3-4 - **8 тижнів** (56 днів)

- » Оскільки кількість доз первинної серії для вакцин Pfizer Infant і Moderna Infant відрізняється, діти віком від 6 місяців до 4 років повинні **завершити свою первинну серію тим самим типом вакцини.**
- » **Бустерні дози** наразі не рекомендуються дітям цього віку.
- » **Після одужання від COVID-19** діти цього вікового діапазону повинні зачекати **56 днів** (8 тижнів), щоб отримати первинну серійну дозу.
- » Вакцини проти COVID-19 можна **вводити разом з іншими вакцинами.**

### Вік 5-11 років

Первинна серія - Pfizer (оригінал)  
Бустер - Бівалентна вакцина Pfizer

#### Рекомендовані інтервали:

**Між первинними серіями доз**

- ✓ Дози 1-2 - **8 тижнів** (56 днів)

**Між первинною серією та бустером**

- ✓ **6 місяців** (168 днів)



- » Після одужання від COVID-19 діти віком 5-11 років повинні почекати **8 тижнів**, щоб отримати дозу первинної серії. Якщо вони завершили первинну серію, їм слід почекати **6 місяців**, щоб отримати бустерну дозу.
- » Вакцини проти COVID-19 можна **вводити разом з іншими вакцинами.**

Дітям віком 5–11 років **із помірним або важким імунodefіцитом** потрібна третя доза вакцини для завершення первинної серії. **Ці діти мають право на отримання вакцини Moderna (оригінальної вакцини) як альтернативи Pfizer.**



**Інтервали між дозами первинної серії**

- ✓ Дози 1-2 - **4 тижні** (28 днів)
- ✓ Дози 2-3 - **8 тижнів** (56 днів)

**Інтервал від первинної серії до ревакцинації**

- ✓ **6 місяців** (168 днів)